



DLP 29 - 4 - 86047587

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA Cedex
Tél 61.24.06.51

PUBLICATION PÉRIODIQUE
Abonnement annuel 115 F
Sous-régisseur Recettes D.D.A. Hte-Gne
CCP 8612-11 R Toulouse

I.S.S.N. : 0752-2053

BULLETIN N° 3 DU 8 AVRIL 1986

COLZA

Stades

Très variables en fonction des dates de semis de C1-C2 (montaison) à E (boutons séparés).

CHARANCON DE LA TIGESituation

Piégeage faible dans le Tarn et la Haute-Garonne.

Piégeage toujours important dans le Gers.

Les cultures sont sensibles jusqu'à ce que la tige mesure 20 cm de hauteur.

Préconisation

Surveiller les cultures tardives et intervenir si le seuil de 10 captures de charançons par cuvette et par jour est dépassé.

Utiliser l'un des produits indiqués dans la note "Ravageurs du colza" expédiée à l'automne 1985.

MELIGETHES - CHARANCONS DES SILIQUESSituation

Meligèthes : activité très importante en toutes zones la semaine dernière.
Charançons des siliques : premiers piégeages.

Préconisations

Seuils d'intervention (après observation de 50 plantes) :

- 1 méligèthe par inflorescence aux stades D1, D2 (boutons accolés)
- 2 à 3 méligèthes par inflorescence au stade E (boutons séparés)
- 1 charançon en moyenne par plante.

Intervenir dès l'arrivée des cultures au stade sensible avec l'un des produits efficaces sur ces deux ravageurs, cités dans la note "Ravageurs du colza" expédiée à l'automne 1985. A noter, la récente autorisation de vente sur méligèthes des deux spécialités suivantes : BAYTROID (10 g de cyfluthrine/ha) et MAVRIK (48 g de fluvalinate/ha).

Attention, la protection contre les méligèthes devient inutile à partir du stade F1 (premières fleurs ouvertes).

ORGE D'HIVER

Stade

5 (redressement) à 7 (deuxième noeud visible).

P.32

RYNCHOSPORIOSE

Situation Présence sur la presque totalité des cultures associée parfois à la Rouille naine.

Préconisation *Intervenir, dès que possible, en utilisant un des produits indiqués dans le tableau ci-après :*

Matières actives	Spécialités commerciales	Dose spécialité par ha	Efficacité Rynchosporiose
carbendazime + flusilazol	PUNCH	0,8 l	●
carbendazime + propiconazole	TILT C	1 l	●
carbendazime + propiconazole + chlorothalonil	TILT SP	2 l	●
carbendazime + flutriafol	IMPACT R SOPRA	1 l	●
carbendazime + fenpropimorphe	CORBEL DUO	2 l	●
carbendazime + mancozèbe + fenpropimorphe	CORVET CM	4 kg	●
carbendazime + triadiméfon + captafol	BAYLETON TRIPLE	2 kg	●
prochloraz	SPORTAK 45	1 l	●
prochloraz + mancozèbe	SPORTAK MZ	1 + 3,5 l	●
carbendazime + prochloraz	SPORTAK PF	1,5 l	●
carbendazime + manèbe + soufre	BLEDOR 3	12,5 kg ou l	●
carbendazime + manèbe + soufre	VOLNEBE	12,5 kg	●
carbendazime + chlorothalonil	BRAVO PLUS	2 l	●
carbendazime + chlorothalonil	CERECLAIR	2 l	●
carbendazime + manèbe + tridémorphe	BAVICAL F	6,25 kg	●
carbendazime + captafol	CERETAL	2 l	●
carbendazime + mancozèbe	EPIDOR P	3,7 kg	○
carbendazime + mancozèbe	KOMBAT	3,1 kg	○
thiophanate méthyl + manèbe	PELTAR	3 kg	○
carbendazime + manèbe + fénarimol	RIMIDINE PLUS	2,5 kg	○

LEGENDE :

- Bonne efficacité
- Efficacité moyenne

BLE D'HIVER

Aucune intervention fongicide ne se justifie actuellement.

TOURNESOL

DESHERBAGE

A noter la nouvelle autorisation de vente de deux spécialités commerciales à utiliser en présemis incorporé : DUELOR à 2,2 l/ha et SONALAN M à 5 kg/ha.